



CimoSkin



Hände-/Hautdesinfektionsmittel¹ 2-Propanol 70% (V/V)

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

¹ Hinweis: 250 ml Pumpspray (Art. 00566) nur für Anwendung zur Hautdesinfektion vorgesehen.

Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek. *	VAH/DGHM, EN 1500
Chirurgische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 1,5 Min. *	VAH/DGHM, EN 12791
Hygienische Händedesinfektion	konz. 30 Sek. *	IfSG § 18, RKI-Liste Bereich A
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek. *	VAH/DGHM
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek. **	DVV/RKLeitlinie
Rotaviren	konz. 15 Sek. **	DVV
Hautdesinfektion talgdrüsenarmer Haut vor Injektionen, Punktionen peripherer Gefäße vor Operationen, Punktionen von Gelenken	konz. 15 Sek. * konz. 1 Min. *	VAH/DGHM VAH/DGHM
Hautdesinfektion talgdrüsenreicher Haut	konz. 3 Min. *	VAH/DGHM
Kühlumschläge	1 : 1 mit Wasser verdünnen	

* Die sauberen, trockenen Hände/Unterarme/Hautbereiche müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konz. Produkt feucht gehalten werden.

**Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet zur Hände- (hygienisch/chirurgisch) und Hautdesinfektion (talgdrüsenarme/-reiche Haut)
- RKI-gelistet, Bereich A (gem. IfSG § 18)
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid
- begrenzt viruzid - inaktiviert alle behüllten Viren inkl. Influenzaviren
- Inaktiviert Rotaviren
- Ohne Duft- und Farbstoffe, empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen
- Komplett frei von potentiell allergisierenden Stoffen, z. B. Iod
- Frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, hervorragende Hautverträglichkeit
- Zur Bereitung von Kühlumschlägen
- Aufgeführt in der IHO Viruzidie-Liste

Gegenanzeigen

Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben in die Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 150 ml Art.-Nr. 20556
Karton mit 9 Pumpsprayfl. à 250 ml Art.-Nr. 00566
Karton mit 20 Eurofl. à 500 ml Art.-Nr. 20562
Karton mit 10 Euro-Fl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00567

Zubehör

Spender manuell EURO 500 ml Art.-Nr. 80058
Spender manuell EURO 1.000 ml Art.-Nr. 80054
Dispenser für Spenderfl. EURO à 500/1.000 ml Art.-Nr. 94787

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil:
2-Propanol 63,1 g; sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Zul.-Nr.: 1599.98.99;

Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

CimoSkin ist in Deutschland als Arzneimittel zugelassen und daher von der Kennzeichnungspflicht nach Gefahrstoffrecht ausgenommen.

Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. CimoSkin wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Stand der Information: 05/2018

0222

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE